



اضطراب هامیلتون

ماکس هامیلتون

نام ارزشیاب:

نام بیمار:

تاریخ:

معنی درجات مختلف ارزشیابی

خفیف: به طور نامنظم و برای مدت‌های کوتاهی این رفتار از مریض مشاهده می‌شود.
متوسط: به طور منظم‌تر و با دوام‌تر و برای مدت‌های طولانی‌تری این رفتار از مریض مشاهده می‌شود و مریض باید کوشش و تقوای زیادی برای کنار آمدن با این مشکل بکار گیرد.
شدید: رفتار مورد نظر دائماً با مریض همراه است و تمام زندگی او را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
خیلی شدید: شدت صفت یا رفتار مورد نظر به حدی است که باعث ناتوانی کامل مریض در مواجهه با وظایف و فعالیت‌های روزمره او می‌گردد.

ارزشیاب برای جلوگیری از هر گونه تأثیر ناخواسته از مطالعه ارزشیابی‌های قبلی مریض خودداری کند.

ارزشیابی					صفت یا رفتار
خیلی شدید	شدید	متوسط	خفیف	وجود ندارد	توضیح و تعریف اضافی
					۱) خلق مضطرب نگران است. منتظر است بدترین حادثه اتفاق بیفتد با ترس به آینده می‌نگرد حساس است.
					۲) تنش یا انقباض عضلانی احساس تنش و کشش عضلانی، خستگی، از جا پریدن، به آسانی به گریه افتادن، لرزیدن، احساس بی‌قراری، ناتوانی در استراحت و آرام گرفتن
					۳) ترس از تاریکی، از افراد غریبه، از تنها ماندن، از حیوانات، از ترافیک، از جاهای شلوغ
					۴) بی‌خوابی اشکال در خواب رفتن، خواب مقطع، خواب ناراحت همراه با خستگی به هنگام بیدار شدن، رؤیا و کابوس‌های زیاد
					۵) عقلی یا شناختی اشکال در متمرکز کردن حواس و دقت، ضعف حافظه
					۶) خلق افسرده از دست دادن علائق، لذت نبردن از سرگرمی‌های معمولی، افسردگی، کله سحر از خواب بیدار شدن. تغییر خلق و روحیه در طی روز



ارزشیابی					صفت یا رفتار
خیلی شدید	شدید	متوسط	خفیف	وجود ندارد	توضیح و تعریف اضافی
					درد و کوفتگی، خشک شدن، رعشه چشم‌های منوکونیک، بهم سائیدن دندان‌ها، لرزش صدا، افزایش تن صدا
					پیچیدن صدا در گوش، ضعف و تیره شدن دید، احساس ناگهانی گرمی یا سردی، احساس ضعف، احساس خواب رفتگی با سوزن خوردن در پوست
					تأکیکاردی، تند شدن ضربان قلب در روی سینه، احساس ضربان در رگه‌ها، احساس غش
					احساس فشار یا گرفتگی در سینه، احساس خفگی، آه کشیدن، تنگی نفس (دیس بی)
					اشکال در بلع، احساس دل درد، احساس سوزش در شکم، احساس پیری در شکم، دل به هم خوردگی، تهوع، اسهال، یبوست، از دست دادن وزن بدن
					افزایش دفعات پیشاب، احساس نیاز به دفع ادرار، قطع عادت ماهانه، عادت ماهانه دردناک، بروز سرد مزاجی، انزال زودرس، از دست دادن علاقه جنسی ایتوناس
					تشنگی دهان، سرخ شدن یا پریدن رنگ صورت، عرق کردن، سرگیجه، سردرد ناشی از تشن، سیخ شدن موها
					وول خوردن، جا به جا شدن، یا قدم زدن، سوزش دست‌ها، چین خوردگی ابروها، صورت در هم کشیدن، آه کشیدن یا تند تند نفس کشیدن، پریدن رنگ صورت، قورت دادن، آروغ زدن، مردمک‌های اتساع یافته، پرش‌های عضلانی شدید، برآمدگی چشم‌ها